

## اثر تنش کمبود آب و کاربرد سوپرچاذب استاکوزورب بر برخی صفات زراعی گندم زمستانه در

### تبریز

سعید جلیلی<sup>۱\*</sup>، معین هادی<sup>۲</sup>، ابوالفضل مجنونیهریس<sup>۳</sup> و رضا دلیرحسن‌نیا<sup>۴</sup>

۱ و ۲) دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

۳ و ۴) دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

\* نویسنده مسئول: Jalili\_saeid@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۵/۰۳

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۲/۰۷

### چکیده

به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب و مواد سوپرچاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، در سال زراعی ۹۵-۱۳۹۴ این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری در سه سطح ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ درصد نیاز آبی گیاه (به ترتیب FC، ۰/۷FC و ۰/۵FC) و مصرف سوپرچاذب استاکوزورب در سه سطح عدم مصرف، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار (به ترتیب S<sub>0</sub>، S<sub>1</sub> و S<sub>2</sub>) بود. نتایج نشان داد اعمال تنش کمبود آب بر تمام صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. اثر مصرف سوپرچاذب بر طول سنبله غیر معنی‌دار، ارتفاع بوته و شاخص برداشت در سطح احتمال پنج درصد و سایر صفات در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. برهمکنش تنش و سوپرچاذب نیز بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و بهره‌وری مصرف آب در سطح احتمال یک درصد و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود. بیش‌ترین میزان عملکرد به میزان ۷/۵۱ تن در هکتار از تیمار S<sub>2</sub>-FC به دست آمد که با تیمار S<sub>1</sub>-۰/۷FC اختلاف معنی‌داری نداشت. بالاترین بهره‌وری مصرف آب نیز به میزان ۱/۳۳ کیلوگرم بر مترمکعب از تیمار S<sub>1</sub>-۰/۷FC به دست آمد که با تیمار S<sub>2</sub>-۰/۷FC اختلاف معنی‌داری نداشت. در مجموع تیمار S<sub>1</sub>-۰/۷FC عملکرد دانه و بهره‌وری مصرف آب را نسبت به تیمار شاهد به ترتیب به میزان ۱۲/۳ و ۳۳ درصد افزایش داد. اگرچه نتایج تحلیل اقتصادی نشان داد که مصرف سوپرچاذب به تنهایی توجیه اقتصادی ندارد. اما تیمار S<sub>1</sub>-۰/۷FC به دلیل افزایش عملکرد و نیز افزایش سطح زیر کشت ناشی از کاهش مصرف آب توصیه می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: بهره‌وری مصرف آب، تحلیل اقتصادی و تنش کمبود آب.

## مقدمه

کم‌آبی و وقوع خشکسالی‌های متوالی باعث بروز مشکلات محدودیت منابع آبی در بسیاری از مناطق دنیا گردیده است. از طرفی با افزایش بی‌رویه جمعیت، تأمین منابع غذایی دنیا با مشکل رو به رو خواهد شد. گندم از مهم‌ترین غلات در تغذیه انسان به شمار می‌رود که در سرتاسر جهان کشت می‌شود و با تولید سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن، بعد از ذرت و برنج بیش‌ترین تولید را در دنیا به خود اختصاص داده است (Asseng *et al.*, 2011). وجود تنش کمبود آب در رشد گیاهان از جمله گندم اختلال وارد نموده و باعث کاهش محصول تولیدی می‌شود. از این رو همواره سعی بر این بوده که با به‌کارگیری روش‌های مختلف، اثر تنش وارده بر گیاهان به حداقل برسد. کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب می‌تواند به عنوان راهکاری برای به حداقل رساندن و یا حتی حذف اثر تنش مؤثر واقع شود. پلیمرهای سوپرجاذب شبکه‌های هیدروفیلی هستند که هم آب جذب می‌کنند و هم مقادیر زیادی آب یا محلول‌های آبدار را نگهداری می‌کنند (Zohurian-mehr and Kabiri, 2008). کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب امکان افزایش ظرفیت نگهداری آب و کارایی مصرف مواد مغذی را بالا می‌برد (Zohurian-mehr and Kabiri, 2008). در مطالعه‌ای به بررسی اثر پلیمرهای سوپرجاذب روی گیاه گندم در بافت خاک لومی پرداخته شد و مشاهده شد که کاربرد سوپرجاذب‌ها باعث بهبود ویژگی‌های فیزیکی خاک و همچنین افزایش باکتری‌های خاک، حجم آب خاک و رطوبت هیگروسکوپی خاک می‌شود (Li *et al.*, 2013). Sepaskhah and Barzegar (۲۰۱۰) اثر سوپرجاذب و کود نیتروژن را بر گیاه برنج در یک اقلیم نیمه‌خشک مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‌ها نشان داد استفاده همزمان از سوپرجاذب و کود نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه، افزایش حجم پروتئین دانه و بهبود بهره‌وری نیتروژن گردید. در پژوهشی گزارش شد که کمبود شدید آب خاک، عملکرد دانه گندم زمستانه را کاهش داد؛ در حالی که کمبود ملایم آب خاک در فاصله زمانی بین زمان از سرگیری رشد فعال در بهار تا زمان پر شدن دانه سبب کاهش عملکرد دانه یا کارایی مصرف آب نشد و از طرفی کارایی مصرف آب در شرایط کم‌آبایی به میزان قابل توجهی افزایش یافت (Zhang *et al.*, 2006). در مطالعه‌ای دیگر به بررسی اثر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب (صفر و هفت درصد وزنی) و تنش خشکی بر پارامترهای زیست توده کل، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و محتوی کلروفیل برگ شش رقم کلزا پرداخته شد. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر سوپرجاذب منجر به افزایش معنی‌دار صفات مورد ارزیابی نسبت به تیمار شاهد گردید اما تنش خشکی منجر به کاهش معنی‌دار همه ویژگی‌های مورد اندازه‌گیری نسبت به شاهد شد (Tohidi-Moghadam *et al.*, 2009). کریمی و نادری (۱۳۸۶) در مطالعه خود نشان دادند که کاربرد هیدروژل‌های سوپرجاذب عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای را تحت شرایط تنش خشکی از طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش شستشوی مواد غذایی و رشد سریع و مطلوب ریشه در خاک بهبود بخشید. با توجه به اهمیت خودکفایی در تولید

محصولاتی مانند گندم، هدف این پژوهش بررسی اثر مواد سوپرچاذب و اعمال تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و بررسی صرفه اقتصادی استفاده از مواد سوپرچاذب در گیاه زراعی یکساله گندم می‌باشد.

## مواد و روش ها


### منطقه مورد مطالعه

این مطالعه در ایستگاه تحقیقاتی کرکج دانشگاه تبریز در واقع در شمال غرب ایران در سال زراعی ۹۵-۱۳۹۴ انجام شد. طول و عرض جغرافیایی منطقه و ارتفاع آن از سطح دریا به ترتیب برابر  $37^{\circ} 37'$  شرقی،  $37^{\circ} 03'$  شمالی و  $1567/3$  متر است (شکل ۱). متوسط بلندمدت میزان بارندگی در محدوده مطالعه مورد نظر کم تر از  $250$  میلی‌متر و متوسط دمای سالیانه  $13/2$  درجه سانتی‌گراد است و مطابق با اقلیم نمای دومارتن دارای اقلیم نیمه‌خشک می‌باشد. با توجه به توزیع فصلی بارش بیش‌ترین محدودیت در اواخر فصل رشد (ماه جولای) حاکم است. متوسط بلندمدت پارامترهای هواشناسی نیز در جدول ۱ ارائه شده است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار برای رقم گندم آبی پیشگام صورت گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح بدون تنش (FC)،  $30$  درصد تنش ( $0/7FC$ ) و  $50$  درصد تنش ( $0/5FC$ ) و کاربرد سوپرچاذب در سه سطح بدون سوپرچاذب ( $S_0$ )، مصرف سوپرچاذب به میزان  $50$  کیلوگرم در هکتار ( $S_1$ ) و مصرف سوپرچاذب به میزان  $100$  کیلوگرم در هکتار ( $S_2$ ) بود. برای این منظور پس از آماده‌سازی و تسطیح زمین کرت‌هایی به ابعاد  $3 \times 2$  متر ایجاد شد و کشت بذور با تراکم  $110$  کیلوگرم بر هکتار در عمق حدود دو سانتی‌متری از سطح خاک در تاریخ  $30$  مهرماه صورت گرفت.

جهت کاربرد سوپرچاذب در تیمارهای مورد نظر شیاری در زیر ردیف‌های کشت ایجاد و با خاک مخلوط شد. قبل از شروع عملیات کشت کود سوپر فسفات تریپل به میزان  $100$  کیلوگرم در هکتار و کود اوره به میزان  $50$  کیلوگرم در هکتار مورد استفاده قرار گرفت. در طول دوره رشد میزان  $50$  کیلوگرم بر هکتار کود اوره در هر یک از مراحل ساقه‌دهی و سنبله-دهی و در مجموع کود اوره به میزان  $150$  کیلوگرم بر هکتار مصرف شد. خاک مزرعه مورد مطالعه با داشتن  $63/6$  درصد شن،  $24/2$  درصد سیلت و  $12/2$  درصد رس جزء خاک‌های لوم شنی به شمار می‌رود. میزان متوسط رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی و پژمردگی دائم به ترتیب برابر  $28$  و هشت درصد حجمی بود. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی خاک مزرعه در جدول ۲ ارائه شده است. آب آبیاری مورد استفاده دارای  $pH = 7/7$  (اسیدیته آب آبیاری) بوده و با  $EC = 0/72 dS/m$  (شوری آب آبیاری) و  $SAR = 1/28$  (نسبت سدیم قابل جذب آب آبیاری) بر اساس طبقه‌بندی ویلکاکس دارای کلاس  $C_2S_1$  بود.

جدول ۱: متوسط بلندمدت پارامترهای هواشناسی منطقه مورد مطالعه

ماه	(%) حداقل رطوبت نسبی	(%) حداکثر رطوبت نسبی	(°C) دمای متوسط	(°C) حداکثر دما	(°C) حداقل دما
فروردین	۳۲/۲۲	۷۴/۷۷	۱۲/۳۲	۱۸/۱۳	۶/۹۰
اردیبهشت	۲۷/۵۹	۶۹/۶۹	۱۷/۵۸	۲۳/۷۹	۱۱/۵۸
خرداد	۲۰/۴۲	۵۴/۹۴	۲۳/۳۵	۳۰/۰۶	۱۶/۷۸
تیر	۲۰/۲۹	۵۰/۹۲	۲۶/۲۷	۳۳/۱۸	۲۰/۱۸
مرداد	۱۸/۴۴	۴۹/۶۰	۲۶/۴۳	۳۳/۴۸	۲۰/۱۴
شهریور	۲۱/۲۹	۵۶/۷۲	۲۱/۳۵	۲۸/۴۲	۱۴/۹۴
مهر	۳۰/۲۶	۶۶/۶۹	۱۴/۵۲	۲۱/۰۷	۸/۹۷
آبان	۴۴/۹۷	۷۹/۰۸	۶/۳۵	۱۱/۷۷	۲/۲۰
آذر	۵۱/۸۱	۸۲/۲۹	۰/۷۵	۵/۵۹	-۲/۷۵
دی	۵۲/۴۶	۸۴/۲۷	-۱/۰۸	۳/۷۲	-۴/۵۷
بهمن	۴۴/۴۴	۸۱/۰۹	۱/۴۴	۶/۷۰	-۲/۷۲
اسفند	۳۴/۹۱	۷۵/۸۱	۶/۵۶	۱۲/۱۶	۱/۶۴



شکل ۱: موقعیت منطقه مورد مطالعه

در طول دوره رشد علف‌های هرز به صورت دستی حذف گردید. پس از تکمیل چرخه رشد و مرحله رسیدگی کامل، عملیات برداشت در نیمه دوم تیرماه با انتخاب قطعه‌ای به ابعاد  $1 \times 1$  متر از وسط هر کرت انجام شد و نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل گردید و پارامترهایی همچون ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی محاسبه شد. همچنین پارامترهای عملکرد دانه، بهره‌وری مصرف آب و شاخص برداشت به صورت زیر تعیین گردید.

### جدول ۲: نتایج آنالیز شیمیایی خاک مزرعه

OC	Zn	Mn	Fe	K	P	N	PH	EC	عمق خاک (سانتی‌متر)
(درصد)	(میلی‌گرم بر کیلوگرم)						(دسی‌زیمنس بر متر)		
۰/۹۷	۰/۴۵	۱۱/۸۵	۷/۱	۴۸۳/۱	۱۵/۸۹	۰/۲۶	۷/۷	۰/۷۶	۰-۳۰
۰/۴	۰/۱۵	۸/۱۶	۳/۰۸	۲۶۶/۷	۱۱/۰۶	۰/۱۱	۷/۶۱	۰/۶۹	۳۰-۶۰

### عملکرد دانه

پارامترهایی همچون تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در تعیین عملکرد دانه مؤثرند. عملکرد دانه بر حسب تن در هکتار از حاصل ضرب تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، و وزن دانه و تقسیم عدد حاصله بر صد هزار به دست آمد.

### بهره‌وری مصرف آب

بر حسب تعریف بهره‌وری آب عبارت است از مقدار ماده خشک تولیدشده به ازای هر واحد آب مصرف‌شده توسط گیاه. نوع گیاه و شرایط آب و هوایی از عوامل مؤثر بر کارایی مصرف آب می‌باشد. بهره‌وری مصرف آب مطابق با رابطه ۱ قابل محاسبه می‌باشد (Liu et al., 2015).

$$WP = Y/V \quad \text{رابطه ۱:}$$

که در آن  $WP$  بهره‌وری کل مصرف آب بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب،  $Y$  میزان عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار،  $V$  کل آب مصرفی شامل آبیاری و بارندگی بر حسب مترمکعب در هکتار می‌باشد.

### شاخص برداشت

شاخص برداشت نمایه‌ای است که برای قسمت قابل استفاده محصول به کار می‌رود و با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌گردد (مهدوی و همکاران، ۱۳۸۴).

$$HI = (GY/BY) \times 100 \quad \text{رابطه ۲:}$$

در آن  $HI$  شاخص برداشت بر حسب درصد و  $GY$ ،  $BY$  به ترتیب عملکرد دانه و بیولوژیکی می‌باشد.

با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی، مقایسه افزایش هزینه تولید ناشی از مصرف سوپرچاذب با افزایش درآمد ناشی از افزایش عملکرد دانه به ازای سوپرچاذب مصرف شده ضروری است. این مقایسه با توجه به قیمت خرید تضمینی گندم در سال آزمایش معادل ۱۲۷۵۰ ریال و نیز قیمت سوپرچاذب استاکوزورب معادل ۲۵۰۰۰۰ ریال صورت می‌گیرد.



### تحلیل‌های آماری


به منظور بررسی اثر اصلی و برهمکنش آبیاری و کاربرد سوپرچاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار IBM SPSS Statistics 20 صورت گرفت. مقایسه میانگین‌ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت پذیرفت.

### نتایج و بحث


نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات در جدول ۳ ارائه شده است. با بررسی میانگین مربعات برای منبع تغییر تکرار مشاهده می‌شود که تمامی صفات به جزء وزن هزار دانه اختلاف معنی‌داری باهم ندارند که این عدم وجود اختلاف معنی‌دار نشان‌دهنده یکنواختی بین تیمارهای تکرار می‌باشد.

برهمکنش معنی‌داری بین سطوح مختلف سوپرچاذب و تنش بر ارتفاع بوته وجود نداشت (جدول ۳). طبق نتایج به دست آمده اعمال سطوح مختلف تنش باعث کاهش ارتفاع بوته‌ها شد و این کاهش در بین تمامی تیمارها معنی‌دار بود. بیش‌ترین میزان ارتفاع به دست آمده مربوط به سطح FC بود. متوسط ارتفاع بوته‌های در تیمارهای ۷۰ و ۵۰ درصد FC به ترتیب به میزان ۲/۵۹ و ۱۳/۷۱ درصد نسبت به سطح شاهد کاهش یافت (شکل ۲). کاربرد سطوح مختلف سوپرچاذب نیز باعث افزایش ارتفاع بوته‌ها شد، ولی این افزایش بین سطوح  $S_1$  و  $S_2$  معنی‌دار نبود. ارتفاع بوته‌های سطوح  $S_1$  و  $S_2$  به ترتیب به اندازه ۳/۲ و ۳/۶۸ درصد نسبت به سطح شاهد ( $S_0$ ) افزایش داشتند (شکل ۳). در مطالعه‌ای روی گندم نان گزارش شد که افزایش شدت تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع گیاه می‌شود و افزایش مصرف زئولیت موجب افزایش ارتفاع گیاه خواهد شد (Maleki et al., 2005).





شکل ۲: اثر اعمال سطوح مختلف تنش کمبود آب بر صفات اندازه‌گیری شده گندم



شکل ۳: اثر کاربرد سطوح مختلف سوپرچادب بر صفات اندازه‌گیری شده گندم

با بررسی اطلاعات مربوط به طول سنبله، اختلاف معنی‌داری بین برهمکنش سطوح مختلف سوپرچادب و تنش مشاهده نشد (جدول ۳). طبق نتایج مشاهده شد که با اعمال تنش کمبود آب طول سنبله به طور معنی‌داری کاهش یافت. طول سنبله برای سطوح تنش 0.7FC و 0.5FC به ترتیب به میزان ۳/۱۲ و ۱۰/۵۲ درصد نسبت به سطح شاهد کاهش یافت (شکل ۲). طول سنبله همچنین با افزایش میزان سوپرچادب نیز افزایش یافت. بیش‌ترین طول سنبله مربوط به سطح S<sub>۲</sub> به میزان ۸/۳۷ سانتی‌متر اندازه‌گیری شد که نسبت به سطوح S<sub>۰</sub> و S<sub>۱</sub> به ترتیب به میزان ۲/۵۱ و ۱/۴۳ درصد بیش‌تر بود (شکل ۳). اثر تیمارهای سوپرچادب، تنش خشکی و برهمکنش آن‌ها بر تعداد سنبله در واحد سطح در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۳). بیش‌ترین تعداد سنبله در واحد سطح به تیمارهای S<sub>۲</sub>-FC و S<sub>۱</sub>-0.7FC اختصاص

یافت که اختلاف معنی‌داری بین این دو تیمار وجود نداشت. کم‌ترین میزان متوسط سنبله در واحد سطح در تیمار  $S_0-0/5FC$  به‌دست آمد (جدول ۴). تعداد سنبله در واحد سطح تیمارهای  $S_1-0/7FC$  و  $S_0-0/5FC$  نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب ۲۴ و ۹/۳ درصد افزایش و کاهش داشت. با مقایسه سطوح مختلف تنش کمبود آب مشاهده شد که اختلاف معنی‌داری بین تمامی سطوح وجود داشت. مقایسه اثر اصلی نشان داد که با افزایش میزان سوپرچاذب، میزان تعداد سنبله در واحد سطح بین تمامی سطوح افزایش معنی‌دار داشت.

اثر تیمارهای سوپرچاذب، تنش خشکی و برهمکنش آن‌ها بر تعداد سنبله در خوشه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۳). در بررسی برهمکنش کاربرد سوپرچاذب و تنش مشاهده که بیش‌ترین تعداد دانه در سنبله به تیمارهای  $S_1-FC$  اختصاص داشت. همچنین کم‌ترین تعداد دانه در سنبله مربوط به تیمار  $S_0-0/5FC$  بود (جدول ۴). تعداد دانه در سنبله تیمارهای  $S_1-FC$  و  $S_0-0/5FC$  در مقایسه با تیمار شاهد به میزان ۳/۵ و ۲۵/۷ درصد به‌ترتیب افزایش و کاهش یافت. با اعمال سطوح مختلف تنش میزان تعداد دانه در سنبله بین سطوح مختلف کاهش معنی‌داری پیدا کرد. فرم‌هینی فراهانی و همکاران (۱۳۹۲) اذعان داشتند در شرایط کم‌آبی، میزان رشد رویشی و مقدار مواد فتوسنتزی گیاه گندم کاهش یافت. این شرایط باعث کاهش گرده‌افشانی گل‌ها می‌شود و ممکن است گلچه‌ها بارور نشده و یا به دلیل شرایط تنش آبی برخی از گل‌های تلقیح شده موفق به دریافت کربوهیدرات کافی برای پر شدن دانه نخواهند شد و در نتیجه تعداد دانه‌ها کم می‌شود. همچنین بررسی آن‌ها نشان داد کاربرد سوپرچاذب موجب افزایش تعداد در سنبله گردید.

جدول ۳: نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی گندم تحت تنش کمبود آب و کاربرد سوپرچاذب

میانگین مربعات										
منابع تغییرات	درجه آزادی	ارتفاع بوته	طول سنبله	تعداد سنبله در واحد سطح	تعداد دانه در سنبله	وزن هزار دانه	عملکرد بیولوژیکی	عملکرد	بهره‌وری	شاخص برداشت
تکرار	۲	۰/۳۹۷ <sup>n.s</sup>	۰/۰۱۸ <sup>n.s</sup>	۲۳۶/۵۹۳ <sup>n.s</sup>	۰/۸۶۱ <sup>n.s</sup>	۱۱/۰۸۱*	۰/۵۲۰ <sup>n.s</sup>	۰/۰۹۹ <sup>n.s</sup>	۰/۰۰۲ <sup>n.s</sup>	۱۸/۰۴۶ <sup>n.s</sup>
تنش خشکی	۲	۱۷۳/۲۷۳**	۱/۹۶۱**	۱۲۷۹۰/۰۳۷**	۱۴۹/۷۱۸**	۸۶/۵۰۱**	۲۵/۳۸۰**	۱۶/۷۶۵**	۰/۱۸۲**	۲۲۸/۴۵۸**
سوپرچاذب	۲	۱۱/۲۹۴*	۰/۱۰۳ <sup>n.s</sup>	۶۶۲۳/۲۵۹**	۱۵/۸۵۹**	۱۳/۴۴۱**	۱۰/۴۲۴**	۴/۷۴۰**	۰/۱۶۹**	۴۶/۱۶۰*
تنش × سوپرچاذب	۴	۴/۵۷۸ <sup>n.s</sup>	۰/۰۶۲ <sup>n.s</sup>	۳۳۴۹/۹۲۶**	۱۳/۴۳۱**	۸/۶۶۱*	۰/۴۰۰ <sup>n.s</sup>	۰/۵۵۳**	۰/۰۲۰**	۱۶/۲۳۰ <sup>n.s</sup>
خطای آزمایش	۱۶	۲/۲۷۳	۰/۰۳۵	۲۱۹/۸۰۱	۰/۶۴۷	۱/۸۹۶	۱/۱۵۲	۰/۰۵۹	۰/۰۰۲	۹/۰۰۷

\*\*، \* و n.s: به ترتیب نشان‌دهنده وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم اختلاف معنی‌دار است.



اثر تیمارهای سوپرچاذب، تنش خشکی و برهمکنش آن‌ها بر وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی‌دار بود (جدول ۳). در بررسی اثر توأم کاربرد سوپرچاذب و اعمال تنش مشاهده شد که بیش‌ترین وزن هزار دانه به دست آمده به تیمار  $S_1-FC$  بود. کم‌ترین وزن هزار دانه به تیمار  $S_0-0/7FC$  اختصاص داشت (جدول ۴). اعمال تنش کمبود آب به میزان ۳۰ و ۵۰ درصد میزان وزن هزار دانه را به طور معنی‌داری کاهش داد. افزایش سطح کاربرد سوپرچاذب باعث افزایش وزن هزار دانه شد. در مطالعه‌ای که به‌منظور بررسی اثر پلیمرهای سوپرچاذب بر روی گندم در استان شانشی<sup>۱</sup> واقع در کشور چین صورت گرفت، اثر کاربرد سوپرچاذب بر افزایش وزن دانه‌های گندم اثبات گردید (Han et al, 2012) که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

اثر برهمکنش تیمارهای سوپرچاذب و تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیکی معنی‌دار نبود (جدول ۳). طبق نتایج حاصله با اعمال تنش کمبود آب عملکرد بیولوژیکی کاهش یافت. بیش‌ترین عملکرد بیولوژیکی به‌دست آمده مربوط به سطح شاهد (FC) بود که به میزان  $13/68$  تن در هکتار اندازه‌گیری شد. عملکرد بیولوژیکی برای سطوح تنش  $0/7FC$  و  $0/5FC$  به ترتیب به میزان  $6/07$  و  $23/61$  درصد نسبت به سطح شاهد کاهش یافت (شکل ۲). عملکرد بیولوژیکی با افزایش میزان کاربرد سوپرچاذب نیز افزایش یافت. بیش‌ترین عملکرد بیولوژیکی به‌دست آمده مربوط به سطح  $S_2$  به میزان  $13/41$  تن در هکتار تعیین شد که نسبت به سطوح  $S_0$  و  $S_1$  به میزان  $16/03$  و  $8/2$  درصد افزایش داشت (شکل ۳).

اثر تیمارهای سوپرچاذب، تنش خشکی و برهمکنش آن‌ها بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۳). در بررسی برهمکنش سوپرچاذب و اعمال تنش کمبود آب با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد، بیش‌ترین عملکرد دانه به‌ترتیب مربوط به تیمارهای  $S_2-FC$  و  $S_1-0/7FC$  بود که تفاوت این تیمارها معنی‌دار نبود. همچنین کم‌ترین میزان عملکرد مربوط به تیمار  $S_0-0/5FC$  بود. با مقایسه تیمارهای  $S_2-FC$ ،  $S_1-0/7FC$  و  $S_0-0/5FC$  با تیمار شاهد می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد دانه تیمارهای  $S_2-FC$  و  $S_1-0/7FC$  نسبت به تیمار شاهد به ترتیب به میزان  $18/64$  و  $12/32$  درصد افزایش و عملکرد دانه تیمار  $S_0-0/5FC$  نسبت به تیمار شاهد به میزان  $22/27$  درصد کاهش داشته است (جدول ۴). با بررسی صفات وابسته به عملکرد دانه برای تیمارهای  $S_2-FC$  و  $S_1-0/7FC$  می‌توان نتیجه گرفت که بین صفات تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سنبله اختلاف معنی‌داری وجود ندارد و عامل اصلی اختلاف مربوط به صفت وزن هزار دانه می‌باشد که موجب افزایش  $5/6$  درصدی عملکرد دانه تیمار  $S_2-FC$  نسبت به تیمار  $S_1-0/7FC$  شده است. بنابراین ایجاد تنش ۳۰ درصد و استفاده از سطح سوپرچاذب  $S_1$  موجب کاهش وزن هزار دانه نسبت به تیمار  $S_2-FC$  شده است (جدول ۴). همچنین عملکرد دانه تیمارهای  $S_1-0/7FC$  و

$S_{2-0}/YFC$  نیز به طور معنی‌داری اختلاف نداشت. در مورد این دو تیمار مشاهده می‌گردد مصرف سوپرچاذب به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نه تنها باعث افزایش عملکرد دانه نشده است بلکه موجب صرف هزینه اضافی جهت تأمین سوپرچاذب شده است (جدول ۴). ایجاد تنش کمبود آب موجب کاهش معنی‌دار در عملکرد دانه گردید. سالمی و افیونی (۱۳۸۴) نیز نتیجه گرفتند که کاهش ۲۰ و ۴۰ درصدی در مصرف آب به ترتیب سبب کاهش ۱۱ و ۱۹ درصدی در عملکرد نهایی گندم شد. با افزایش میزان سوپرچاذب مورد استفاده عملکرد دانه نیز به طور معنی‌داری افزایش یافت.

اثر تیمارهای سوپرچاذب، تنش خشکی و برهمکنش آن‌ها بر بهره‌وری مصرف آب در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود (جدول ۳). در بررسی برهمکنش سوپرچاذب و اعمال تنش کمبود آب با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد، بیش‌ترین میزان بهره‌وری مصرف آب مربوط به تیمارهای  $S_{1-0}/YFC$  و  $S_{2-0}/YFC$  بود. همچنین کم‌ترین میزان بهره‌وری مصرف آب به تیمار  $S_{0-0}/\Delta FC$  اختصاص داشت. با مقایسه تیمارهای  $S_{1-0}/YFC$ ،  $S_{2-0}/YFC$  و  $S_{0-0}/\Delta FC$  با تیمار شاهد می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌وری آب تیمارهای  $S_{1-0}/YFC$  و  $S_{2-0}/YFC$  نسبت به تیمار شاهد به ترتیب به میزان ۳۳ و ۳۰ درصد افزایش و بهره‌وری آب تیمار  $S_{0-0}/\Delta FC$  نسبت به تیمار شاهد به میزان ۲۳ درصد کاهش داشته است. با بررسی صفات وابسته به بهره‌وری مصرف آب برای تیمارهای  $S_{1-0}/YFC$  و  $S_{2-0}/YFC$  می‌توان نتیجه گرفت که بین مقدار آب آبیاری برای دو تیمار تفاوتی وجود ندارد و تنها عامل اختلاف مربوط به کاربرد دو سطح سوپرچاذب مجزا می‌باشد که می‌توان مشاهده نمود که استفاده از سوپرچاذب به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار باعث تغییر معنی‌داری در بهره‌وری مصرف آب نسبت به تیمار حاوی سوپرچاذب به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار نشده است (جدول ۴). اعمال سطوح مختلف تنش کمبود آب موجب تغییرات معنی‌دار در بهره‌وری مصرف آب گردید. با افزایش میزان سوپرچاذب مورد استفاده بهره‌وری مصرف آب نیز به طور معنی‌داری افزایش یافت. منتظر (۱۳۸۷) در تحقیق خود گزارش کرد که استفاده از پلیمرهای سوپرچاذب در کشاورزی فاریاب نه تنها شرایط را برای بهبود کمی و کیفی عملکرد فراهم می‌آورد، بلکه باعث افزایش قابل توجه کارایی مصرف آب نیز می‌شود.

اثر برهمکنش تیمارهای سوپرچاذب و تنش خشکی بر شاخص برداشت معنی‌دار نبود (جدول ۳). با بررسی اطلاعات مربوط به شاخص برداشت مشاهده شد که با اعمال تنش کمبود آب افزایش معنی‌داری بین سطوح مختلف تنش مشاهده شد. با بررسی اطلاعات مربوط به شاخص برداشت مشاهده شد که با اعمال تنش کمبود آب افزایش معنی‌داری بین سطوح  $FC$  و  $0/\Delta FC$  مشاهده شد. بیش‌ترین مقدار به‌دست آمده مربوط به سطح  $0/YFC$  بود و مقادیر ماده شاخص برداشت برای سطوح  $FC$  و  $0/\Delta FC$  به ترتیب به میزان  $0/04$  و  $17/52$  درصد نسبت به سطح  $0/YFC$  کاهش داشتند (شکل ۲). همچنین

کاربرد سوپرچادب باعث افزایش شاخص برداشت شد. میزان متوسط شاخص برداشت برای سطوح  $S_1$  و  $S_2$  به ترتیب به میزان ۹/۲ و ۸/۴۴ درصد نسبت به شاهد افزایش داشت (شکل ۳).

جدول ۴: اثرات متقابل صفات مورد آزمایش در تیمارهای مختلف

تیمار	تعداد سنبله در واحد سطح	تعداد دانه در سنبله	وزن هزار دانه (گرم)	عملکرد دانه (تن در هکتار)	بهره‌وری مصرف آب (کیلوگرم بر مترمکعب)
<b><math>S_0</math> FC</b>	۳۷۶/۳۳ <sup>d</sup>	۴۲/۰۲ <sup>b</sup>	۴۰/۰۷ <sup>b</sup>	۶/۳۳ <sup>d</sup>	۱ <sup>cd</sup>
<b><math>S_1</math> FC</b>	۳۷۱ <sup>d</sup>	۴۳/۵۰ <sup>a</sup>	۴۲/۸۳ <sup>a</sup>	۶/۶۰ <sup>cd</sup>	۱/۰۴ <sup>cd</sup>
<b><math>S_2</math> FC</b>	۴۶۶/۶۷ <sup>a</sup>	۴۰/۱۷ <sup>c</sup>	۴۰/۱۰ <sup>b</sup>	۷/۵۱ <sup>a</sup>	۱/۱۸ <sup>b</sup>
<b><math>S_0</math> 0.7FC</b>	۴۰۴ <sup>c</sup>	۳۷/۶۴ <sup>d</sup>	۳۴/۲۰ <sup>e</sup>	۵/۲۰ <sup>e</sup>	۰/۹۸ <sup>de</sup>
<b><math>S_1</math> 0.7FC</b>	۴۶۷/۳۳ <sup>a</sup>	۴۰/۶۹ <sup>bc</sup>	۳۷/۴۰ <sup>cd</sup>	۷/۱۱ <sup>ab</sup>	۱/۳۳ <sup>a</sup>
<b><math>S_2</math> 0.7FC</b>	۴۳۲/۳۳ <sup>b</sup>	۴۰/۴۴ <sup>c</sup>	۳۹/۶۷ <sup>bc</sup>	۶/۹۳ <sup>bc</sup>	۱/۳۰ <sup>a</sup>
<b><math>S_0</math> 0.5FC</b>	۳۳۳ <sup>e</sup>	۳۱/۲۰ <sup>f</sup>	۳۴/۴۷ <sup>e</sup>	۳/۵۸ <sup>e</sup>	۰/۷۷ <sup>f</sup>
<b><math>S_1</math> 0.5FC</b>	۳۶۹/۶۷ <sup>d</sup>	۳۳/۶۷ <sup>e</sup>	۳۴/۸۳ <sup>e</sup>	۴/۳۳ <sup>f</sup>	۰/۹۳ <sup>e</sup>
<b><math>S_2</math> 0.5FC</b>	۳۷۶/۳۳ <sup>d</sup>	۳۷/۰۳ <sup>d</sup>	۳۵/۳۳ <sup>de</sup>	۴/۹۲ <sup>e</sup>	۱/۰۶ <sup>c</sup>

تیمارهای دارای یک حرف مشترک بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری در سطح احتمال ۵ درصد ندارند.

### تحلیل اقتصادی

یکی از جنبه‌های مهم در تصمیم‌گیری، تحلیل‌های اقتصادی است. افزایش درآمد ناشی از افزایش کمی محصول و یا کاهش میزان مصرف آب و در نتیجه آن امکان افزایش سطح زیر کشت با استفاده از آب ذخیره شده، گزینه‌های مناسبی به منظور ترغیب کشاورزان نسبت به عملی کردن یافته‌های این پژوهش خواهد بود. با توجه به قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز و نیز قیمت سوپرچادب استاکوزورب، کاربرد آن زمانی توصیه می‌شود که افزایش عملکرد در هر هکتار به ازای مصرف هر کیلوگرم سوپرچادب، حداقل ۲۰ کیلوگرم باشد تا حداقل افزایش هزینه تولید ناشی از مصرف سوپرچادب را جبران کند. نتایج به دست آمده از تیمارها نشان داد مصرف سوپرچادب بدون اعمال تنش کمبود آب توجیه اقتصادی ندارد. در صورت آبیاری در سطح ۰/۷FC، مصرف سوپرچادب در سطح  $S_1$ ، عملکرد را در مقایسه با سطح  $S_0$  به میزان ۱/۹۱ تن در هکتار افزایش می‌دهد که کاملاً مطلوب است؛ در حالی که میزان افزایش عملکرد گندم با مصرف سوپرچادب در سطح  $S_2$ ، افزایش هزینه تولید را جبران نمی‌کند. البته لازم به ذکر است تیمار  $S_1-0.7FC$  در مقایسه با تیمار شاهد ( $S_0-FC$ )، عملکرد را به میزان ۰/۷۸ تن در هکتار افزایش داده است که به در حدود ۲۲۰ کیلوگرم کمتر از حداقل مقدار مورد نیاز برای جبران هزینه مصرف سوپرچادب است. اما با توجه به محدودیت روزافزون منابع آبی در دسترس بخش کشاورزی، با توجه به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب آبیاری در این تیمار، می‌توان سطح زیر کشت را افزایش داد و یا حتی

این آب ذخیره شده را برای تک‌آبیاری تکمیلی اراضی دیم به کاربرد که در تحقیقات متعددی بر اثر مثبت آن در افزایش عملکرد اشاره شده است (Oweis, 1997, تدین و امام، ۱۳۸۶ و توکلی، ۱۳۹۲). همچنین نتایج برهمکنش کاربرد سوپرچاذب و تنش ۵۰ درصد نیز نشان داد کاربرد سوپرچاذب در این سطح از تنش توجیه اقتصادی ندارد. شایان ذکر است تأثیر سوپرچاذب در خاک، تنها در سال اول کشت نبوده و در مورد گیاهان چند ساله و یا زراعت‌های آبی نیز اثرگذار خواهد بود (گنجی خرم‌دل، ۱۳۷۸). بنابراین ممکن است اثرات مفیدی نیز در سال‌های پس از مصرف داشته باشد که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

### نتیجه‌گیری

با توجه به محدودیت منابع آبی، در این پژوهش اثر اعمال تنش کمبود آب از طریق کم‌آبیاری به همراه کاربرد سوپرچاذب استاکوزورب بر عملکرد گندم، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد مصرف سوپرچاذب در تمام سطوح تنش، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب را افزایش داد. تنش کمبود آب نیز عملکرد را کاهش داد؛ در حالی که بهره‌وری مصرف آب در سطح تنش  $0.7FC$  افزایش داشت. همچنین تیمار  $S_1-0.7FC$  عملکرد و بهره‌وری مصرف آب را در مقایسه با تیمار  $S_0-0.7FC$  به ترتیب به میزان  $36/7$  و  $35/7$  درصد افزایش داد؛ در حالی که افزایش عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب معادل  $12/3$  و  $33$  درصد حاصل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مصرف سوپرچاذب در گندم بدون اعمال مدیریت‌های کم‌آبیاری توجیه اقتصادی ندارد.

### منابع

- تدین، م. ر. و امام، ی. ۱۳۸۶. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم. مجله پژوهش‌های زراعی ایران. ۵(۲): ۲۶۹-۲۵۹.
- توکلی، ع. ر. ۱۳۹۲. کم‌آبیاری و مدیریت آبیاری تکمیلی گندم آبی و دیم در شهرستان سلسله. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. ۲۷(۴): ۶۰۰-۵۸۹.
- سالمی، ح. ر. و افیونی، د. ۱۳۸۴. اثر تیمارهای کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام جدید گندم. فصلنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ۱۲(۳): ۲۰-۱۱.
- فرمهبینی فراهانی، م.، میرزاخانی، م. و ساجدی، ن. ع. ۱۳۹۲. اثر تنش کم‌آبی و کاربرد مواد جاذب رطوبت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم پاییزه در اراک. یافته‌های نوین کشاورزی. ۳: ۲۶۳-۲۷۴.

- کریمی، ا. و نادری، م. ۱۳۸۶. بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‌ای در خاک‌های با بافت مختلف. مجله پژوهش کشاورزی. ۷(۳): ۱۹۷-۱۸۷.
- گنجی خرم‌دل، ن. ۱۳۷۸. تأثیر پلیمر جاذب رطوبت PR3005A بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- منتظر، ع. ا. ۱۳۸۷. بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیشروی و پارامترهای نفوذ خاک در روش آبیاری جویچه‌ای. مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). ۲۲(۲): ۳۵۷-۳۴۱.
- مهدوی ف، اسماعیلی م.ع، فلاح، ا. و پیردشتی ه. ا. (۱۳۸۴). مطالعه خصوصیات مرفولوژیک، شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج (*Orzya sativa* L.). مجله علوم زراعی ایران. ۷(۴): ۲۹۷-۲۸۰.

Asseng, S., Foster, I. and Turner, N. 2011. The impact of temperature variability on wheat yields. *Global Change Biology*. 17: 997-1012.

Han, Y., Yu, X., Yang, P., Li, B., and Wang, C. 2012. Dynamic on water diffusivity of soil with super-absorbent polymer application. *Environ Earth Science*. 69: 289-296.

Li, X., He, J. Z., Hughes, J., Liu, Y. R. and Zheng, Y. M. 2013. Effects of super-absorbent polymers on soil-wheat (*Triticum aestivum* L.) system in the field. *Applied Soil Ecology*, 73:58-63.

Liu, E.K., Mei, X. R., Yan, C. R., Gong, D. Z. and Zhang, Y.Q. 2015. Effects of water stress on photosynthetic characteristics, dry matter translocation and WUE in two winter wheat genotypes. *Agriculture Water Management*. 167: 75-85.

Maleki, A., Majidi harvan, A., Heydari shrifabadi, H. and Normohammadi, GH. 2005. Evaluation of drought tolerance bread wheat landraces and improved water conditions and drought. *Journal of Modern Agriculture*. 5(16):79-86.

Oweis, T. 1997. Supplemental Irrigation: A highly efficient water-use practice. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria.

Sepaskhah, A. R. and Barzegar, M. 2010. Yield, water and nitrogen-use response of rice to zeolite and nitrogen fertilization in a semi-arid environment. *Agriculture Water Management*, 98:38-44.

Tohidi-Moghadam, H. R., Shirani-Rad, A. H., Nour-Mohammadi, G., Habibi, D., Modarres-Sanavy, S. A. M., Mashhadi-Akbar-boojar, M. and Dolatabadian, A. 2009. Response of six oilseed rape genotypes to water stress and hydrogel application. *Pesquisa Agropecuaria Tropical* 39(3): 243-250.

**Zhang, B., Li, F. M., Huang, G., Cheng, Z.Y. and Zhang, Y. 2006.** Yield performance of spring wheat improved by regulated deficit irrigation in an arid area. *Agricultural Water Management*. 79: 28–42.

**Zohurian-mehr, M. J., and Kabiri, K. 2008.** Superabsorbent polymer materials: A review. *Iranian Polymer Journal*, 17 (6): 451-477.